

Enterococi rezistenți la vancomicină (ERV)

Informații și recomandări pentru pacienți

Măsuri de prevenție și control al infecțiilor

Dacă aveți sugestii privind modificarea sau îmbunătățirea informațiilor din această broșură, luați legătura cu personalul bibliotecii SWB la interior 3587 sau trimiteți un mesaj la adresa de e-mail swbh.library@nhs.net.



Fundația educațională a Universității din Birmingham

Include spitalele City, Sandwell și Rowley Regis

© Sandwell and West Birmingham Hospitals, Fundația NHS

ML5005

Data publicării: ianuarie 2023

Data revizuirii: Ianuarie 2026

PATIENTS
PEOPLE
POPULATION

Ce sunt ERV?

Enterococii rezistenți la vancomicină (ERV) sunt bacterii care populează intestinele și nu pot fi tratați cu anumite antibiotice, cum ar fi vancomicină.

ERV pot fi nocivi?

În majoritatea cazurilor, ERV sunt prezenți în mod normal în intestin și nu cauzează infecții. Cu toate acestea însă, ERV pot cauza uneori infecții la pacienții care au nevoie de terapie intensivă sau în timpul chimioterapiei. Infecția cu ERV se tratează cu antibiotice. ERV pot cauza infecții cum ar infecții renale, ale leziunilor sau în cazuri grave infecții în sânge, infecții renale, infecții ale leziunilor. Dacă pacientul este mai vulnerabil la infecție și infecția este cauzată de ERV, poate fi dificil de tratat, pentru că multe dintre antibioticele folosite de obicei nu vor avea efect asupra ERV. Medicii trebuie înștiințați cât mai curând cu putință dacă un pacient este purtător de ERV pentru a alege antibioticele cele mai eficiente pentru tratarea infecției.

Cum se poate infecta cineva cu ERV?

Pacienții care au luat deja multe antibiotice sunt mai expuși riscului de a contracta ERV. Motivul este acela că agenții patogeni sunt mai expuși la antibiotice și, prin urmare, probabilitatea de a dezvolta „rezistență” la antibiotic este mai mare, astfel că antibioticul respectiv nu mai are efect.

Pacienții, cadrele medicale sau vizitatorii pot fi purtători de ERV, indiferent dacă sunt asimptomatici sau infectați. Se poate răspândi la pacienți prin contact direct sau prin atingerea obiectelor sau suprafețelor atinse de persoana infectată cu ERV, de exemplu, balustradele paturilor, toalete sau echipamente. Pacienții internați în spital sunt mult mai vulnerabili la infecții decât cei care primesc îngrijiri la domiciliu, iar din acest motiv este necesară aplicarea unor măsuri de precauție speciale pentru a preveni transmiterea ERV între pacienții internați.

Observații

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ce se întâmplă după ce ajung acasă?

Nu este nevoie să luați măsuri de precauție speciale la domiciliu. Persoanele din comunitate sunt, în general, în bună formă fizică și sănătoase, așadar este mai puțin probabil să contracteze ERV comparativ cu pacienții internați în spital. Îmbrăcămintea, așternuturile și vasele pot fi spălate ca de obicei. Este foarte important ca în orice situație să vă spălați bine pe mâini după folosirea toaletei și înainte de pregătirea și luarea meselor, pentru a împiedica transmiterea agentului patogen la alte persoane. Mâinile curate vă protejează pe dumneavoastră și pe ceilalți de multe infecții, nu numai de ERV.

Voi scăpa de ERV?

Este posibil ca organismul dumneavoastră să elimine ERV din intestin pe măsură ce vă recuperați, dar nu este valabil în toate cazurile. ERV poate rămâne în intestin pentru o anumită perioadă de timp. Administrarea de antibiotice poate favoriza reparația infecției în intestin, prin urmare nu luați antibiotice decât dacă aveți un motiv întemeiat. Antibioticele pot trata infecția cu ERV, dar nu elimină ERV din intestin.

Dacă aveți întrebări sau doriți mai multe informații despre ERV, adresați-vă în orice moment personalului medical în îngrijirea căruia vă aflați.

Date de contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, adresați-vă medicului curant, medicului de familie sau personalului din spital. Puteți lua legătura cu echipa de prevenție și control al infecțiilor la numărul de telefon 0121 554 3801 (cereți la Serviciul de prevenție și control al infecțiilor).

Sau ne puteți trimite o scrisoare la:

Echipa de prevenție și control al infecțiilor

City Hospital
Dudley Road
Birmingham
B18 7QH

Informații suplimentare

Puteți găsi mai multe informații pe site-ul serviciului de Sănătate Publică Anglia: <https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england>.

Pentru mai multe informații despre spitalele și serviciile noastre, vizitați site-ul nostru www.swbh.nhs.uk, urmăriți-ne pe Twitter [@SWBHnhs](https://twitter.com/SWBHnhs) și dați-ne „like” pe Facebook www.facebook.com/SWBHnhs.

Surse utilizate pentru informațiile din această broșură

Sănătate Publică Anglia (2008) Speciile de enterococi și enterococii rezistenți la glicopeptide (ERG). Se poate consulta pe: <https://www.gov.uk/guidance/enterococcus-species-and-glycopeptide-resistant-enterococci-gre> (accesat la 30 ianuarie 2023).